



Belgian Cancer Registry

**TECHNISCHE FICHES
KWALITEITSINDICATOREN
RECTUM-, PROSTAAT-, LONG-, ENDOMETRIUM- en
HOOFD- en HALSKANKER (2013-2015)**



A. Inclusie- en exclusiecriteria voor deze studie

Inclusiecriteria:

- Tumorspecifieke topografie- en morfologiecodes (ICD-O¹): zie afzonderlijke indicatoren.
- Invasieve tumoren met een incidentiedatum (datum van diagnose) in de periode 2013-2015.

Exclusiecriteria:

- Invasieve tumoren waarvoor cTNM² niet van toepassing is.

Opmerking:

De berekeningen zijn gebaseerd op de gegevens zoals ze origineel door de ziekenhuizen bij de BCR³ werden aangeleverd.

B. Interpretatie van de resultaten

De resultaten worden grafisch weergegeven in een funnel plot.

De streefwaarde (target) is weergegeven als referentiewaarde in de funnel plot.

In de funnel plot bakenen respectievelijk het 95% en 99.8% predictie-interval een trechtersvormige zone af rondom de referentiewaarde.

De proportie voor uw ziekenhuis is aangeduid met een rood symbool. De proporties van de andere Belgische ziekenhuizen zijn aangeduid met zwarte bollen.

Indien de proportie van een ziekenhuis binnen de grenzen van het predictie-interval (de trechtersvormige zone) rondom de referentiewaarde valt, kan de proportie niet als verschillend beschouwd worden van de streefwaarde.

Indien de proportie van een ziekenhuis boven de bovengrens van het predictie-interval rondom de referentiewaarde valt, is de proportie groter dan de vooropgestelde streefwaarde.

Indien de proportie van een ziekenhuis onder de ondergrens van het predictie-interval rondom de referentiewaarde valt, is de proportie kleiner dan de streefwaarde.

¹ <http://www.who.int/classifications/icd/adaptations/oncology/en/>

² Sobin L, Gospodarowicz MK and Wittekind Ch. TNM Classification of Malignant Tumours, 7th Edition. 2010, Wiley-Blackwell.

³ Belgian Cancer Registry

C. Technische fiches met indicator-specifieke inclusiecriteria

Indicator “% ongekend klinisch stadium” voor invasieve rectumkanker

Indicatorspecifieke inclusiecriteria:


- Patiënten gediagnosticeerd met een invasieve rectumkanker:
 - Primaire tumoren met lokalisatie C20.9 (ICD-O)
 - Morfologiecodes [8000-8589] (ICD-O)

Definitie teller en noemer:

Teller: Alle patiënten gediagnosticeerd met invasieve rectumkanker in de loop van incidentiejaren 2013-2015, waarvoor het klinisch stadium als ongekend geregistreerd staat bij de BCR.

Noemer: Alle patiënten gediagnosticeerd met invasieve rectumkanker in de loop van incidentiejaren 2013-2015.

Flow chart:



Databanken:

BCR: patiënt- en tumorkarakteristieken



Indicator “% ongekend klinisch stadium” voor invasieve prostaatkanker

Indicatorspecifieke inclusiecriteria:


- Patiënten gediagnosticeerd met een invasieve prostaatkanker:
 - Primaire tumoren met lokalisatie C61.9 (ICD-O)
 - Morfologiecodes [8000-8589] (ICD-O)

Definitie teller en noemer:

Teller: Alle patiënten gediagnosticeerd met invasieve prostaatkanker in de loop van incidentiejaren 2013-2015, waarvoor het klinisch stadium als ongekend geregistreerd staat bij de BCR.

Noemer: Alle patiënten gediagnosticeerd met invasieve prostaatkanker in de loop van incidentiejaren 2013-2015.

Flow chart:



Databanken:

BCR: patiënt- en tumorkarakteristieken



Indicator “% ongekend klinisch stadium” voor invasieve longkanker

Indicatorspecifieke inclusiecriteria:


- Patiënten gediagnosticeerd met een invasieve longkanker:
 - Primaire tumoren met lokalisatie C34 (ICD-O)
 - Morfologiecodes [8000-8589] (ICD-O)

Definitie teller en noemer:

Teller: Alle patiënten gediagnosticeerd met invasieve longkanker in de loop van incidentiejaren 2013-2015, waarvoor het klinisch stadium als ongekend geregistreerd staat bij de BCR.

Noemer: Alle patiënten gediagnosticeerd met invasieve longkanker in de loop van incidentiejaren 2013-2015.

Flow chart:



Databanken:

BCR: patiënt- en tumorkarakteristieken



Indicator “% ongekend klinisch stadium” voor invasieve endometriumkanker

Indicatorspecifieke inclusiecriteria:

- Patiënten gediagnosticeerd met een invasieve endometriumkanker:
 - Primaire tumoren met lokalisatie C54.0 - C55.9 (ICD-O)
 - Morfologiecodes [8000-8589] (ICD-O)

Opmerking:


Voor endometriumkanker werd, naast cTNM classificatie, eveneens FIGO⁴ classificatie beschouwd als een aangeleverd klinisch stadium.

Definitie teller en noemer:

Teller: Alle patiënten gediagnosticeerd met invasieve endometriumkanker in de loop van incidentiejaren 2013-2015, waarvoor het klinisch stadium als ongekend geregistreerd staat bij de BCR.

Noemer: Alle patiënten gediagnosticeerd met invasieve endometriumkanker in de loop van incidentiejaren 2013-2015.

Flow chart:



Databanken:

BCR: patiënt- en tumorkarakteristieken

⁴Fédération Internationale de Gynécologie et d'Obstétrique

Indicator “% ongekend klinisch stadium” voor invasieve hoofd- en halskanker

Indicatorspecifieke inclusiecriteria:


- Patiënten gediagnosticeerd met een invasieve hoofd-en halskanker:
 - Primaire tumoren met lokalisatie C00 – C14, C30 – C32 (ICD-O)
 - Morfologiecodes (ICD-O)
 - [8000-8589]
 - [8720-8790]

Definitie teller en noemer:

Teller: Alle patiënten gediagnosticeerd met invasieve hoofd- en halskanker in de loop van incidentiejaren 2013-2015, waarvoor het klinisch stadium als ongekend geregistreerd staat bij de BCR.

Noemer: Alle patiënten gediagnosticeerd met invasieve hoofd- en halskanker in de loop van incidentiejaren 2013-2015.

Flow chart:



Databanken:

BCR: patiënt- en tumorkarakteristieken

