

Comment coder une dysplasie légère/modérée/sévère dans un système de classification binaire?

Informations de base (qui peuvent donner lieu à une certaine confusion) :

- Lésion de haut grade (high-grade LESION)
 - o En fonction de l'organe, dénomination commune pour les lésions avec dysplasie **modérée ou sévère** (moderate or severe dysplasia) ou seul synonyme de lésion avec dysplasie **sévère** (severe = high grade dysplasia)
- Lésion de bas grade (low-grade LESION)
 - o En fonction de l'organe, ceci correspond aux lésions avec **dysplasie légère** (mild dysplasia) ou à la dénomination commune pour les lésions avec **dysplasie légère ou modérée** (mild or moderate dysplasia)
 - o Selon certaines sources, il est préférable de parler de '**dysplasie non de haut grade**' plutôt que de 'lésion de bas grade ou dysplasie de bas grade', afin d'éviter que la dysplasie modérée ne soit considérée erronément comme de haut grade

En pratique, comment coder la dysplasie légère/modérée/sévère dans un système de classification binaire avec uniquement des lésions de bas/haut grade ?

Une lésion de haut grade (HSIL = high-grade squamous intra-epithelial lesion) dans le cadre du dépistage du **cancer du col de l'utérus**, a une autre signification qu'une lésion de haut grade dans le cadre du dépistage du **cancer du côlon**. HSIL est (avant tout) une dénomination commune pour les lésions présentant des cellules modérément à sévèrement atypiques sur un frottis cervical et nécessite ensuite une confirmation histologique. On ne peut normalement pas retenir un diagnostic de lésion in situ ou invasive s'il se base uniquement sur une cytologie du COL DE L'UTERUS ! Dans le cadre du dépistage du carcinome colorectal, un examen cytologique n'est pas d'emblée effectué et on a affaire directement à des biopsies.

Conclusion

Pour la gynécologie (CIN, VIN, VAIN,...)

- ➔ Lésion de haut grade : dénomination commune pour les lésions avec dysplasie modérée ou sévère : CIN II/III ; VIN II/III ; VAIN II/III ; HSIL
- ➔ Lésion de bas grade: ceci correspond aux lésions avec dysplasie légère (mild dysplasia) : CIN I, VIN I, VAIN I, LSIL

Pour les lésions gastro-intestinales (ASIN, PSIN, AIN, ...)

- ➔ Lésion de haut grade : dénomination commune pour les lésions avec dysplasie sévère: AIN II/III, HSIL, ASIN-H, PSIN-H, polype avec dysplasie sévère
- ➔ Lésion de bas grade : ceci correspond aux lésions avec dysplasie légère ou modérée (mild or moderate dysplasia): AIN I, LSIL, ASIN-L, PSIN-L, polype avec dysplasie légère ou modérée.

ASIN = anal squamous intra-epithelial neoplasia (ASIN-H = high grade ASIN; ASIN-L = low grade ASIN); PSIN = peri-anal squamous intra-epithelial neoplasia (PSIN-H = high grade PSIN; PSIN-L = low grade PSIN)

Version corrigée en mars 2021